



RSウイルス感染症とは・・・

RSウイルスの感染による呼吸器の感染症です。

何度も感染と発病を繰り返しますが、生後1歳までに半数以上が、2歳までにほぼ100%の人が、少なくとも1度は感染するとされています。2021年以降は春から初夏に継続した増加がみられ、夏にピークがみられています。

症状は・・・

発熱、鼻汁などの軽い風邪のような症状から重い肺炎まで様々です。RSウイルスの初回感染時には、より重症化しやすいといわれています。特に生後6ヶ月以内にRSウイルスに感染した場合には、細気管支炎、肺炎など重症化する場合があります。重症化するリスクの高い基礎疾患を有する小児や、生後6か月以内の乳児への感染は特に注意が必要です。また、慢性呼吸器疾患などの基礎疾患を有する高齢者も注意が必要です。



治療方法と受診の目安について

RSウイルス感染症は特効薬がなく、基本的には対症療法を行います。咳がひどくなる、呼吸が苦しそう、食事や水分摂取ができない時などは医療機関への受診をご検討ください。

RSウイルスに感染しないために注意すべきこと！

RSウイルスは主に、接触感染と飛沫感染で感染が広がります。

接触感染対策としては、子どもたちが日常的に触れるおもちゃ、手すりなどはこまめにアルコールや塩素系の消毒剤などで消毒し、流水・石鹸による手洗い、またはアルコール製剤による手指衛生が重要です。飛沫感染対策としては、鼻汁、咳などの呼吸器症状がある場合はマスクが着用できる年齢の子どもや大人はマスクを使用することが大切です。



| 定点種別                                 | 疾患名                    | 状況 | 17週(4/22~4/28) |      | 18週(4/29~5/5) |      |
|--------------------------------------|------------------------|----|----------------|------|---------------|------|
|                                      |                        |    | 報告数            | 定点当り | 報告数           | 定点当り |
| C<br>O<br>V<br>I<br>D<br>-<br>1<br>9 | インフルエンザ                | —  | 30             | 1.20 | 13            | 0.52 |
|                                      | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | /  | 59             | 2.36 | 46            | 1.84 |
| 小<br>児<br>科                          | RSウイルス感染症              | /  | 28             | 1.75 | 20            | 1.25 |
|                                      | 咽頭結膜熱(プール熱)            | —  | 3              | 0.19 | 4             | 0.25 |
|                                      | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎          | —  | 85             | 5.31 | 55            | 3.44 |
|                                      | 感染性胃腸炎                 | —  | 90             | 5.63 | 39            | 2.44 |
|                                      | 水痘(みずぼうそう)             | —  | 10             | 0.63 | 2             | 0.13 |
|                                      | 手足口病                   | —  | 10             | 0.63 | 10            | 0.63 |
|                                      | 伝染性紅斑(りんご病)            | —  | 1              | 0.06 | 0             | 0.00 |
|                                      | 突発性発しん                 | /  | 13             | 0.81 | 7             | 0.44 |
|                                      | ヘルパンギーナ                | —  | 2              | 0.13 | 1             | 0.06 |
|                                      | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)        | —  | 0              | 0.00 | 0             | 0.00 |
| 眼<br>科                               | 急性出血性結膜炎               | —  | 0              | 0.00 | 0             | 0.00 |
|                                      | 流行性角結膜炎(はやり目)          | —  | 6              | 1.20 | 1             | 0.20 |
| 基<br>幹                               | 細菌性髄膜炎                 | /  | 0              | 0.00 | 0             | 0.00 |
|                                      | 無菌性髄膜炎                 | /  | 1              | 0.20 | 0             | 0.00 |
|                                      | マイコプラズマ肺炎              | /  | 0              | 0.00 | 0             | 0.00 |
|                                      | クラミジア肺炎(オウム病を除く)       | /  | 0              | 0.00 | 0             | 0.00 |
|                                      | 感染性胃腸炎(ロタウイルス)         | /  | 0              | 0.00 | 0             | 0.00 |

※「状況」欄は、疾患ごとの警報・注意報レベルを表示しています。表中の斜線は、基準値が定められていないことを示します。

○:警報レベル △:注意報レベル —:警報・注意報レベルなし