



山や草むらでの野外活動の際は、マダニにご注意を！


マダニの活動が盛んな春から秋にかけては咬まれる危険性が高まります。

主なダニ媒介感染症	潜伏期	主な症状
つつが虫病	5～14日	全身倦怠感、食欲不振、頭痛、悪寒、発熱、発疹
日本紅斑熱	2～8日	頭痛、発熱、倦怠感、発疹
SFTS	6日～2週間程度	発熱、消化器症状（嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血） 時に、腹痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状

【マダニの生息場所】

マダニは、シカやイノシシ、野ウサギなどの野生動物が出没する環境に多く生息しています。また、民家の裏山や裏庭、畑、あぜ道などにも生息しています。

人が野外作業や農作業、レジャー等で、これらのマダニの生息場所に立ち入ると、マダニに咬まれることがあります。



- ◇ 帽子・手袋を着用し、首にタオルを巻くなど肌の露出を少なくする。
- ◇ マダニを目視で確認しやすいように、明るい色の服を着る。
- ◇ 長袖・長ズボンを着用し、シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下・長靴の中に入れる。
- ◇ サンドルなどは避け、足を完全に覆う靴を履く。
- ◇ 上着や作業着は、家の中に持ち込まないようにする。
- ◇ 屋外活動後は入浴し、マダニに咬まれていないか確認する。

定点 種別	疾患名	状況	22週(5/26～6/1)		23週(6/2～6/8)	
			報告数	定点当り	報告数	定点当り
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	—	9	0.36	23	0.92
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)		24	0.96	19	0.76
	急性呼吸器感染症(ARI)		1638	65.52	1618	64.72
小児科	RSウイルス感染症		1	0.06	4	0.25
	咽頭結膜熱(プール熱)	—	7	0.44	12	0.75
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	—	20	1.25	27	1.69
	感染性胃腸炎	—	49	3.06	63	3.94
	水痘(みずぼうそう)	—	4	0.25	3	0.19
	手足口病	—	6	0.38	4	0.25
	伝染性紅斑(りんご病)	—	19	1.19	18	1.13
	突発性発しん		13	0.81	13	0.81
	ヘルパンギーナ	—	0	0.00	1	0.06
	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	—	3	0.19	2	0.13
眼科	急性出血性結膜炎	—	0	0.00	0	0.00
	流行性角結膜炎(はやり目)	—	6	1.20	12	2.40
基幹	細菌性髄膜炎		0	0.00	1	0.20
	無菌性髄膜炎		0	0.00	0	0.00
	マイコプラズマ肺炎		7	1.40	6	1.20
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)		0	0.00	0	0.00
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		3	0.60	1	0.20

※「状況」欄は、疾患ごとの警報・注意報レベルを表示しています。表中の斜線は、基準値が定められていないことを示します。

○:警報レベル △:注意報レベル —:警報・注意報レベルなし