



新型コロナウイルス感染症について

高齢者や基礎疾患のある方が感染した場合は、重症化するおそれがあります。感染対策として、「マスクの着用を含めた咳エチケット」や「手洗い(手指消毒)」、「換気」等が効果的です。

【新型コロナウイルスに感染した場合】

発症後5日間かつ症状が軽快して24時間程度は他人に感染させるリスクが高いことから、外出を控えることが推奨されます。

また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用するなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合にも、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

【お世話をする方や同居家族の方について】

感染した方の発症日を0日として、特に5日間は注意してください。

7日目までは発症する可能性があります。外出する時には人混みを避け、不織布マスクの着用や、高齢者などのハイリスク者との接触を控えるなど、配慮をしましょう。

詳しくは厚生労働省HP
「新型コロナウイルス感染症について」



重症化リスクの高い方への感染を防ぐためにも、医療機関・高齢者施設などを訪問する時は、マスクを着用しましょう。

定点種別	疾患名	状況	33週(8/11~8/17)		34週(8/18~8/24)	
			報告数	定点当り	報告数	定点当り
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	-	4	0.17	4	0.17
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	/	180	7.50	240	10.43
	急性呼吸器感染症(ARI)	/	1032	43.00	1262	54.87
小児科	RSウイルス感染症	/	4	0.27	7	0.50
	咽頭結膜熱(プール熱)	-	7	0.47	2	0.14
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	9	0.60	12	0.86
	感染性胃腸炎	-	39	2.60	66	4.71
	水痘(みずぼうそう)	-	2	0.13	0	0.00
	手足口病	-	2	0.13	5	0.36
	伝染性紅斑(りんご病)	○	26	1.73	26	1.86
	突発性発しん	/	9	0.60	16	1.14
	ヘルパンギーナ	-	10	0.67	6	0.43
眼科	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	-	0	0.00	0	0.00
	急性出血性結膜炎	-	0	0.00	0	0.00
基幹	流行性角結膜炎(はやり目)	-	4	0.80	8	1.60
	細菌性髄膜炎	/	0	0.00	0	0.00
	無菌性髄膜炎	/	1	0.20	1	0.20
	マイコプラズマ肺炎	/	12	2.40	16	3.20
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	/	0	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	/	0	0.00	0	0.00	

※「状況」欄は、疾患ごとの警報・注意報レベルを表示しています。表中の斜線は、基準値が定められていないことを示します。
○:警報レベル △:注意報レベル -:警報・注意報レベルなし